



مراحل آماده‌سازی پرولیا® برای تزریق


مرحله اول: آماده‌سازی پرولیا® برای تزریق

الف) سرنگ آماده مصرف را از بسته بندی خارج کنید و سایل مورد نیاز جهت تزریق را آماده کنید. برای انجام یک تزریق راحت، بهتر است ۳۰ دقیقه صبر کنید تا سرنگ آماده مصرف به دمای اتاق برسد. دستان خود را با آب و صابون بخوبی بشویید. سرنگ آماده مصرف را در یک مکان تمیز و با نور مناسب، قرار دهید. پنبه های آغشته به الکل یا پد الکلی و ظرف جهت اجسام برنده را دسترس قرار دهید.

- سرنگ آماده مصرف را به هیچ شیوه دیگری، بعنوان مثال با آب داغ یا مایکروفر گرم نکنید.
- سرنگ آماده مصرف را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید.
- سرنگ آماده مصرف را تکان ندهید.
- سرنگ های آماده مصرف را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

ب) پوشش پلاستیکی سرنگ را بردارید. با گرفتن محافظ ایمنی سرنگ، سرنگ آماده مصرف را از بسته بندی خارج کنید.

- جهت رعایت نکات ایمنی، موارد زیر را رعایت کنید:
- از گرفتن و کشیدن با زور سرنگ از پیستون آن خودداری کنید.
- از گرفتن و کشیدن با زور سرپوش خاکستری جهت خارج کردن سرنگ خودداری کنید.



ج) ظاهر دارو و سرنگ آماده مصرف را بررسی کنید.


- از مصرف سرنگ آماده مصرف در حالات زیر خودداری کنید:
 - ۱- در صورت کدر بودن یا وجود ذرات داخل آن
 - ۲- وجود ترک یا شکستگی
 - ۳- عدم وجود سرپوش خاکستری رنگ سرسوزن یا محکم نبودن آن در جای خود
 - ۴- در صورتیکه تاریخ انقضا (یعنی آخرین روز از ماه درج شده) گذشته باشد.
- در صورت بروز هر کدام از موارد فوق به پزشک خود اطلاع دهید.

مرحله دوم: محل تزریق

الف) دستان خود را بخوبی بشویید. محل تزریق را آماده و تمیز کنید.

محل تزریق:

- بالای ران ها
- شکم، به غیر از ۵ سانتی متری دور ناف
- قسمت خارجی بالای بازو (فقط زمانی که فرد دیگری تزریق را برای شما انجام می‌دهد)



AMGEN®

prolia®
denosumab
A FORCE AGAINST FRACTURE




ادامه مرحله دوم:

محل تزریق را با پنبه الکلی تمیز کنید. صبر کنید تا پوست خشک شود.

قبل از تزریق به محل تزریق دست نزنید.

- در هر بار تزریق، محل تزریق را تغییر دهید. در صورتیکه می خواهید در همان محل تزریق قبل دوباره تزریق کنید، نقطه تزریق را تغییر دهید.
- از تزریق در نواحی که پوست نازک، قرمز، سفت، زخمی یا دچار ترک خوردگی و تاول شده است، خودداری کنید.



(ب) با دقت سرپوش خاکستری رنگ سر سوزن را مستقیم به سمت دور از بدن خود بیرون بکشید.

(ج) محل تزریق را بین دو انگشت شست و اشاره محکم بگیرید. در حین تزریق، پوست را به همین شکل بگیرید و نگه دارید.

مرحله سوم: تزریق

(الف) محل تزریق را بین دو انگشت شست و اشاره گرفته و نگه دارید.

- به محل تمیز شده تزریق دست نزنید.




(ب) پیستون را به آرامی و به صورت ممتد فشار دهید تا صدای قفل شدن پیستون را بشنوید.

- پیستون را بطور کامل تا انتها فشار دهید تا مقدار کامل دارو تزریق گردد.

(ج) انگشت شصت خود را بردارید و سرنگ را از پوست بیرون بکشید.

- بعد از آزاد کردن پیستون، محافظ ایمنی سرنگ روی سوزن را می پوشاند.

- سرپوش خاکستری رنگ سر سوزن را دوباره بر روی سر سوزن قرار ندهید.



مرحله چهارم: پایان تزریق

(الف) سرنگ استفاده شده و سایر وسایل را در ظرف مخصوص جمع آوری اجسام برنده بیاندازید.

- سرنگ و ظرف اجسام برنده را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- از استفاده مجدد از سرنگ مصرف شده خودداری کنید.

(ب) محل تزریق را معاینه کنید.

- اگر در محل تزریق خونریزی اتفاق افتاد، پنبه یا گاز استریل را روی محل تزریق فشار دهید. از ماساژ دادن محل تزریق خودداری کنید.
- در صورت نیاز، از نوار چسب استفاده کنید.



Behestan darou (p.j.s)

No.10 Behestan Bldg. Pardis St., Mollasadra Ave.
P.Code 1991915613 Tehran ,Iran P.O. Box 14155-4318
Tel: +98 (21) 88774200 Fax: +98 (21)88780030

prolia
denosumab
A FORCE AGAINST FRACTURE